



Le tarissement est une période très importante pour la lutte contre les cellules mais aussi pour préparer la nouvelle lactation.

Le tarissement

L'objectif du tarissement est de reposer la glande mammaire et de guérir les infections subcliniques de la mamelle.

Le tarissement : mode d'emploi :

1. - Arrêt des concentrés individuels une semaine avant la date prévue pour le tarissement pour faciliter la diminution de la sécrétion lactée
2. - Vérification de l'absence de mammites cliniques (sinon réaliser un traitement antibiotique " lactation " et reporter la date de tarissement après le délai d'attente du produit)
3. - Tarissement sur une seule traite
4. - Injection d'une suspension antibiotique " hors lactation " après désinfection du bout des trayons avec une serviette spéciale ou du coton imbibé d'alcool.
5. - Désinfection des 4 trayons (utiliser si possible un produit à effet barrière)
6. - Mise à l'écart de l'ambiance de traite (aire d'attente, salle de traite)

La lutte contre les cellules

Lors du traitement au tarissement, le choix du produit antibiotique est important et doit être raisonné en fonction de ce qui se passe dans le troupeau. Le traitement a deux intérêts :

- curatif : soigner les vaches infectées de façon subclinique et qui ont beaucoup de cellules à la fin de la lactation (plus de 800 000 sur plusieurs mois).
- préventif : empêcher l'apparition de mammites pendant la période sèche, voir au vêlage.



Tableau de choix de la durée de tarissement

Choix	Durée	Durée raccourcie à 6 semaines	Période classique 2 mois	Durée allongée à + de 2 mois
Objectifs		<ul style="list-style-type: none"> • Éviter le surengraissement • Favoriser le taux protéique 		<ul style="list-style-type: none"> • Favoriser la reprise d'état • Gérer des stocks alimentaires insuffisants
Cible d'animaux		<ul style="list-style-type: none"> • Vaches en 3^e lactation et plus • Vaches en état corporel excessif 	Tous	<ul style="list-style-type: none"> • Primipares vêlage 24 mois • Animaux maigres • Vaches avec mammites à répétition en fin de lactation
Animaux non concernés		<ul style="list-style-type: none"> • Primipares • Animaux à fort taux cellulaire 		<ul style="list-style-type: none"> • Animaux en état

LE TARISSEMENT

Ceci n'est réalisable qu'avec des produits ayant une longue persistance (minimum 3 semaines) dans la mamelle à des concentrations efficaces.

Attention aux inhibiteurs !

Pour la laiterie, le risque inhibiteur est grand, il faut donc identifier les vaches tariées (bandes adhésives...) et les isoler du reste du troupeau pour éviter les risques de traite accidentelle.

Au vêlage, il faut écarter le lait pendant 7 jours (14 traites) au minimum. En cas de vêlage précoce, le délai d'attente est au minimum de 14 jours (28 traites) ; en cas de doute n'hésitez pas à faire appel à votre vétérinaire ou à votre laiterie.

L'alimentation

La période de tarissement d'une vache laitière peut être comparée à la mise en condition d'un sportif qui doit se préparer à accomplir un important effort.

En été et automne, cette période doit donc s'accompagner du respect de quelques points :

- Une note d'état au tarissement de 3 à 3,5
- En cas de pâturage jeune ou de regains, limiter la surface et compléter avec du foin grossier ou de la bonne paille (pour limiter l'excès d'azote, d'engraissement et garder du volume à la panse)
- Si l'herbe manque ou si sa qualité fait défaut, compléter avec 1 à 2 kg de céréales ou 10 kg brut de maïs ensilage.
- Maintenir une complémentation minérale (pour éviter les non-délivrances), en veillant à ce que la ration totale n'apporte pas plus de 60 g de calcium (pour éviter les fièvres de lait). Du respect de l'alimentation de la vache tariée, dépendront son démarrage en lactation et sa fécondité à venir.

La durée

Une modulation de la durée de tarissement peut s'envisager. Il faut néanmoins savoir qu'avec un tarissement raccourci, on aura des modifications de la production : moins de lait (pic écrêté), TB et TP supérieurs.

La période de tarissement doit être surveillée et maîtrisée ; ce n'est absolument pas une période où on laisse ses vaches sans soin. Cette période est primordiale pour le bon déroulement de la lactation suivante.